

Kasvi	Suositteltu annos kg/ha	Käyttökertojen määrä/ kausi (maksimi)	Maksimi käyttö määrä/ kasvukausi	Käsittelyaika	Kommentti	Varo aika (vrk)
Omena, päärynä, luumu ja kirsikka	2 kg Valmistetta levitettäessä traktoriruiskulla vesimäärä on 200–900 l/ha riippuen kasvuston kehitysasteesta ja riviruiskulla 600–900 l/ha. Kun valmistetta levitetään reppuruiskulla, käytettävä vesimäärä on 600–900 l/ha (0,6–0,9 l/10 m ²).	3	6 kg/ha	BBCH 53–99	Torjuntakohteet: Kääriäiset* (Cydia pomonella, Archips spp. jne.) Mittarit (Operopthera brumata jne.) Kehräjäkoit (Yponomeuta malinella) Käsittelyväli: 7 vrk	1 vrk
Tomaatti, kurkku, paprika ja maustepaprika kasvihuoneessa	0,1 % liuos (100 g/ 100 l vettä); 1 kg/ha 100 g/1 000 m ²	6	6 kg/ha	Käsittely tehdään heti perhostoukkien ilmaantuessa kasvustoon.	Torjuntakohteet: Yökköset (Chrysodeixis chalcites, Authographa gamma, Polia oleracea, Plusia spp. Lacanobia oleracea) Käsittelyväli: 7 vrk	1 vrk
Valkokaali, punakaali, savoiijinkaali, suippokaali, ruusukaali, lehtikaali, Kiinankaali, pinaattikiinankaali ”pak choi”, kukkakaali, parsakaali, kyssäkaali, sareptansinappi, lanntu ja nauris	1 kg Valmistetta levitettäessä traktoriruiskulla vesimäärä on 200–900 l/ha riippuen kasvuston kehitysasteesta ja riviruiskulla 600–900 l/ha. Kun valmistetta levitetään reppuruiskulla, käytettävä vesimäärä on 600–900 l/ha (0,6–0,9 l/10 m ²).	3	3 kg	Käsittely tehdään heti perhostoukkien ilmaantuessa kasvustoon.	Koiperhoset (Plutella xylostella) Kaaliperhoset (Pieris spp.), Torjuntakohteet: Yökköset (Polia oleracea, Authographa gamma, Plusia spp.) Käsittelyväli: 7 vrk	1 vrk
Koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla	1 kg	6	6 kg/ha	Käsittely tehdään heti perhostoukkien ilmaantuessa kasvustoon.	Torjuntakohteet: Kaaliperhoset (Pieris spp.), Yökköset (Plusia spp. Mamestra spp.) Käsittelyväli: 7 vrk	1 vrk
Taimistot	1 kg	6	6	Käsittely tehdään heti perhostoukkien ilmaantuessa kasvustoon.	Torjuntakohteet: Kaaliperhoset (Pieris spp.) Yökköset (Plusia spp., Mamestra spp.) Villakkaat (Euproctis chrysorrhoea, Leucoma salicis, Lymantria dispar) Kehräjäkoit (Yponomeuta spp.) Käsittelyväli: 7 vrk	1 vrk
Kuusen siemenviljelykset	2 kg Vesimäärä 500 l/ha	3	6	Käsittely tehdään emikukkien kukinnan vaiheessa P2 ja P3.	Torjuntakohteet: Koisaperhoset (Dioryctria spp.), Mittarit (Eupithecia spp.) Käsittelyväli: 7 vrk	1 vrk

* Omenakääriäisen torjunnassa teho voi olla heikko sellaisina vuosina kun muninta tapahtuu suoraan raakileeseen.