

# Ranman®

## TOP

## Kasvitautien torjuntaan

**Tehoaine:** Sytsofamidi 160 g/l

**Valmistetyyppi:** SC

**Käyttäjryhmä:** Ammattikäyttäjät

### Käyttötarkoitus:

Lehti- ja mukularuton torjuntaan perunalla.

### Huomautukset:

Valmiste säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

**Rekisterinumero:** 3147

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojaineena 23.2.2012.

## För bekämpning av växtsjukdomar

**Aktiv substans:** cyazofamid 160 g/l

**Preparattyp:** SC

**Användarkategori:** Yrkesmässig användning

### Användningsändamål:

För bekämpning av potatisbladmögel och brunröta i potatis.

### Anmärkningar:

Förvaras torrt och frostfritt.

**Registernummer:** 3147

Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt produkten att användas som växtskyddsmedel 23.2.2012

Nettoilavuus  
Nettovolyum:  
**5Le**



Luvanhaltija/tillståndsinnehavare:

**ISK BIOSCIENCES Europe N.V.**  
Pegasus Park - De Kleetlaan 12B  
B-1831 Diegem - Belgium

Edustaja Suomessa - Representant i Finland:  
Bernier Oy Ab, Viilelän Berner, Puh/ Tel 020 791 4040  
www.viilelanberner.fi

Hankkija Oy, Puh/ Tel 010 76 83000, www.hankkija.fi

Lantmännen Agro Oy, www.lantmannenagro.fi

Ranman® är registrerat varumärke för Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.  
Ranman® on Ishihara Sangyo Kaisha Ltd:n rekisteröimä tavaramerkki.



**Nordisk Alkali**

member of the Belchim Group

Jakelualueudet / Distributionsrättigheter:

**Belchim / Nordisk Alkali AB**

Hanöгатan 8 - 211 24 Malmö - Tel 040 680 85 30 - Fax 040 93 84 00 - info@nordiskalkali.se



#### Käytön rajoitukset:

Varoaika: 7 vrk.

#### Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saasu vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruukkimattam tuuliseilla sääillä. Vesiastian rajoittivilla alueilla ruukkituotteesta on jätettävä vesieliöiden suojaomaisuus 3 metrin suojaetäisyydessä vesistöihin.

Traktoriinuskun täyttöön vesiä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä jyllyänjää ruiskutusnestettä tai ruiskupesunestettä saa päästää vesiin.

Maaperän eliöiden suojeleminen Ranman Top -valmistetta tai muita samsafomiaidia sisältäviä valmistelmia ei saa käyttää useamminkun joko toinen vuosi samalla kasvuluokalla.

Käyttö samalla kasvuluokalla peräkkäisiin vuosina on kuitenkin sallittua, mikäli käyttöohjeita on enintään kolme kasvukauden aikana.

Ylijäänyt käyttöestoväline kasvusuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

#### Suojaingoheet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisapaitta, suojajuoppa, kemikaalin kestäviä suojaesineitä (esim. nitrili) ja päähineitä. Roiskevaraara aiheuttavissa työtiloissa on lisäksi käytettävä kasvojen-/silmiensuojainta.

#### Käyttöohje:

Käyttömäärä on 0,5 l/Ranman Top/ha. Vesiäärä on 200 – 400 l/ha. Valmistetta saa käyttää vain lehtiruohon ja mukularuohon ennaltaehkäisevään torjuntaan perunalla. Ruukitusväli on 5-7 vrk perunan kuituasteesta ja tautipaineesta riippuen. Ensimmäinen ruukitus tehdään ruokustuksen mukaan, kun riisä taudin leviämiseksi on korkea, kuitenkin yleensä ennen kastonestuutusta. Ruukitukset aloitetaan aikaisemmin, jos alueella on maaturtaantota tai muuten voimakasta tautipainetta. Ranman Top antaa hyvän suojan lehtiruotoa ja mukulatuotosta vastaan, kunhan käytetään kahdeksan ensimmäisen ruukituksen jälkeen vähintään kahdeksan päivän välein ruukitusväliä, joka suojaa kasvin latvuista vesiä ruukitusnesteen jälkeinkin (esim. Epoka). Myöhemmissä ruukituksissa on hyvä tehdä osi ruukituskestäviä valmistelmia, jolla on erikoisvaimekanismin kun Ranman Top -valmisteen samsafomiaidilla. Keskivaiheisiin ruukituksiin Ranman Top soveltuu hyvin hyvän mukulatuotteen ansista.

#### Ruukituskutenneikka:

Ruukitusnesteen valmistus: Ruukitusruukitusyö aina puhtaalla ruiskulla. Täytä ruiskun tankki vähintään puolella tarvittavasta vesiäärästä. Lisää tarvittava määrä Ranman Top -valmistetta sekoittajan ollessa loput vedestä. Lisää loput vedestä. Anna sekoittajan käydä kuumies kaikki neste on ruukittu. Valmistista kerralla vain tarvitsessa lisää ruukitusnestettä.

Tankkiseokset: Ranman Top-valmistetta voidaan ruukittaa tankkiseoksen

mikroravinteiden, Spotlight Plus-valmisteen ja öljyn kanssa. Tankkiseosvalmistetta lisätään tankkiin sekoittajan ollessa käynnissä, kun 90 % vedestä on tankissa.

Ruukitus: On tärkeää, että ruukitusnestettä peittää koko kasvin. Ranman Top -valmistetta on ruukittava sekä tavallisella että ilma-avusteisella ruiskulla.

Ruukitus pesu: Pese ruukku puhtaalla vedellä ja ruukku laimennettu luos käsitellylle pelloille.

#### Resistenssin hallinta:

Ranman Top -valmistetta saa ruukittaa enintään kuusi kertaa kasvukauden aikana samalle lehtokolle. Ruukitusohjelman ensimmäisissä ruukituksissa on vuoroteltava muiden valmistelmien kanssa. Valmistetta, jotka suojaavat kasvin latvuista vesiä ruukitusnesteen jälkeinkin, sopivat ruukituskeuseen parhaiten (esim. Epoka). Myöhemmissä ruukituksissa on hyvä vuorotella erilaisien vaikutusmekanismien omaavien valmistelmien kanssa. Ranman Top -valmisteen tehoinne kuuluu vaikutustavataan ns. Oil-kasvitauteinaiseiin (FRAC ryhmä 21).

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieleiöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Käytä suojaesineitä/suojaavaatusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Suuhdo huolellisesti vedellä usein minuutin ajan. Poista piloilinnsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhottamista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Valmurt on kerätävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Osarak allvarig ögonirritation.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddsglasögon/ögonskydd/analytiskskydd.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarpjäpp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

#### Bränsningar i användningen:

Karenstid 7 dygn.

#### Förhindrande av skador i miljön:

Föreoren inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder. Vid sprutning av områden med gräs och andra växter, använd stråga ett skyddsavstånd på 3 m från vattnet och beakt för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktor/spruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutningsaggregatsvika får inte släppas ut i vattnet/drag.

För att skydda marklevande organismer från Ranman Top eller andra produkter som innehåller cyazofamid inte användas på samma skifte oter än väntanart är. Användning på samma skifte under på varandra följande år är ändå tillåten, om man sprutar preparat högst en gång per år.

Överbliven, oanvänd växtskyddsmedel för till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköjda förpackningar för till en lämplig föstplation.

#### Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör skyddsdräkt, gummitövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (tex nitril) och huvudbonad användas. I arbetsituationer som orsakar risk för stark bör de utrustas ansiktis-/ögonskydd användas.

#### BRUKSANVISNING:

Bruksmängden är 0,5 l/Ranman Top/ha. Vattenmängden är 200 – 400 l/ha. Preparatet används endast för förebyggande bekämpning av bladlögel och brunröta i potatis. Sprutintervallen är 5 – 7 dygn beroende på potatisens utvecklingsstadium och sjukdomstrycket. Den första besprutningen görs enligt godtagelse när risken för smitta är stor. Normalt är det strax innan potatisens blomstadiet slutar sig. Starta behandlingarna tidigare om det finns smittor eller när det finns i området. Ranman Top ger ett gott skydd mot bladlögel och brunröta på det använde året i de första fyra besprutningarna. Som andra preparat lönar det sig att använda en produkt som skyddar blastillväxten ännu efter besprutningen (tex Epoka). Också i senare besprutningar är det bra att göra en del av behandlingarna med en produkt som har annan verkningsmekanismin än Ranman Top-produktens cyazofamid. Till de sista besprutningarna under säsongen lämpar sig Ranman Top väl på grund av sin goda effekt mot brunröta i knölarina.

#### Spillretnikk:

Tävlingsretnikk av sprutvätska: Det är viktigt att sprutarbetet påbörjas med en ren spruta. Fyll sprutan med minst hälften av den beräknade mängden vatten. Häll i den rätta mängden Ranman Top medan blandaren är påslagen. Tillsett resten av vattnet. Låt blandaren vara påslagen tills allt är utsprutat. Framställt inte mera sprutvätska än vad som går åt på en gång.

Tänkbandning: Ranman Top kan sprutas i tankblandning med mikronäring. Spotlight Plus och öjja. Alla blandningspreparat tillätsks när ca 90 % av vattenmängden är påfylld och under ombrörring.

Sprutning Det är viktigt att hela plantan täcks vid behandlingen. Fungerer utmärkt i både konventionell och luftfästare spruta.

Tvätt av sprutan: Tvätta sprutan med ren vatten och spruta den utspädda lösningen i det behandlade fältet.

#### RESISTENSHANTERING:

Ranman Top får sprutas högst sex gånger under växtperioden på samma skifte. I sprutning av potatis ska sprutningspreparat sprutas på samma skifte med andra produkter. Bäst lämpar sig sådana produkter som skyddar tillväxten ännu efter besprutningen (tex Epoka) att ingå i sprutprogrammet. Även i senare besprutningar är det bra att växla mellan olika verkningsmekanismer. Den aktiva substansen i Ranman Top har en verkningsmekanismin som hör till de sk. Oil-fungiciderna (FRAC grupp 21).