

Kultur	Rekommenderad dos/ha	Max antal beh.	Max dos/säsong	Tidpunkt	Kommentar	Karenstid
Äpple, päron, plommon och körsbär	2 kg När traktorspruta används är vattenmängden 200–900 l/ha, beroende på växtbeståndets växtstadium och med radspruta 600–900 l/ha. När preparatet används med ryggspruta skall 600–900 l/ha (0,6–0,9 l/10 m ²) användas.	3	6 kg/ha	BBCH 53–99	Mot vecklare*, mätare och spinnmalar Behandlingsintervall: 7 dagar	1 dag
Tomat, gurka, paprika och chili i växthus	0,1 % lösning (100 g/ 100 l vatten); 1 kg/ha 100 g/1 000 m ²	6	6 kg/ha	Behandlingen görs direkt när fjärilslarver upptäcks i växtbeståndet.	Mot nattflyn Behandlingsintervall: 7 dagar	1 dag
Kålväxter på friland; rödkål, savojkål, spetskål, brysselkål, grönkål, kinakål, blomsellerikål "pak choi", blomkål, broccoli, kålrabbi, sareptaspenap, kålrot, rova	1 kg När traktorspruta används är vattenmängden 200–900 l/ha, beroende på växtbeståndets växtstadium och med radspruta 600–900 l/ha. När preparatet används med ryggspruta skall 600–900 l/ha (0,6–0,9 l/10 m ²) användas.	3	3 kg	Behandlingen görs direkt när fjärilslarver upptäcks i växtbeståndet.	Mot malar, kålfjärilar, Nattfly Behandlingsintervall: 7 dagar	1 dag
Prydnadsväxter och blommor	1 kg	6	6 kg/ha	Behandlingen görs direkt när fjärilslarver upptäcks i växtbeståndet.	Mot kålfjäril, Yökköset Behandlingsintervall: 7 dagar	1 dag
Plantskoleväxter och perenner	1 kg	6	6	Behandlingen görs direkt när fjärilslarver upptäcks i växtbeståndet.	Mot kålfjärilar, nattflyn, tofsspinnare, spinnmalar Behandlingsintervall: 7 dagar	1 dag
Fröodling av gran och tall	2 kg Vattenmängd 500 l/ha	3	6	Behandlingen görs under pistillens blomningskede P2 och P3.	Mot mott Behandlingsintervall: 7 dagar	1 dag

* Effekten mot äppelvecklare kan vara svag sådana år då äggläggningen sker direkt på karten.